

## کلوزاپین

تهیه کننده: ناصر حاجی آقایی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

سال تهیه: ۱۳۹۳

گروه هدف: بیماران و همراهان

تایید کننده: دفتر آموزش

### مراقبت های مصرف کلوزاپین

به هیچ عنوان دارو بدون اجازه پزشک قطع نشود  
در صورت بروز هرگونه تب ، عفونت و گلودرد  
پزشک خود را مطلع کند.

قبل از مصرف دارو فشارخون خود را اندازه  
بگیرید ، در صورت فشارخون زیر 9 دارو را  
مصرف ننمایید و به پزشک خود اطلاع دهد ( به  
خصوص در ابتدای درمان )

دوره درمان با این دارو باید کامل شود. این دارو  
نباید بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده مصرف  
شود.

در صورت عدم مصرف دارو به مدت 2 روز یا  
بیشتر، پیش از مصرف باید با پزشک مراجعه  
شود. در صورت خشکی دهان از آدامس بدون  
شکر یا آب نبات جهت افزایش ترشحات دهانی  
استفاده کنید.

هنگام تغییر وضعیت از حالت خوابیده به نشسته و  
به ایستاده به آرامی اینکار را انجام دهد.

از مصرف سیگار و چای یک ساعت قبل و یک  
ساعت بعد از مصرف دارو پرهیز کنید.

در صورت فراموش کردن يك نوبت مصرف دارو، به  
محض به یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود. مگر  
اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فراسید باشد.  
در این صورت از مصرف نوبت فراموش شده و  
دوبرابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری  
نمود.

اگر فشار خون خود در طول دوره درمان بیش از 3  
درجه کاهش پیدا کرد به پزشک خود اطلاع دهید  
( مثلاً همیشه فشارتان 15 بوده و اکنون 11 شده  
است )

در صورت افزایش بیش از حد ترشحات دهانی به  
خصوص هنگام خواب به پزشک خود اطلاع دهید و  
هنگام خواب حوله ای روی بالش خود پهن کنید.

مصرف مایعات خود را تا 2 لیتر در روز افزایش  
دهید .

از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند  
پرهیزید.

در صورت بروز عارضه یبوست به پزشک خود  
اطلاع دهید.

در صورت داشتن هر گونه علامت مبنی بر بی قراری  
، لرزش عضلات صورت ، حرکات غیر ارادی زبان  
و گرفتگی صدا به پزشک خود اطلاع دهید.

حالت خواب آلودگی این دارو معمولاً چند هفته پس از  
مصرف دارو برطرف می شود. در صورت خواب  
آلودگی بیش از حد به پزشک خود اطلاع دهید.

## کلوزاپین چیست ؟

کلوزاپین یک داروی ضدسایکوز ( ضد روان پریشی ) است ، که برای روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی استفاده می شود .

بررسی منظم خون کسانی که کلوزاپین مصرف می کنند ، ضروری است .

کلوزاپین برای درمان اسکیزوفرنی در بیمارانی که به سایر داروهای ضد سایکوز پاسخ نمی دهند یا نسبت به آن داروها عدم تحمل دارند، مصرف می شود .

سایکوز یا روان پریشی : به معنای وضعیت روحی روانی غیرطبیعی است که در طی آن فرد میتواند به توهمات ، هذیانات ، رفتار عجیب و غریب و گفتار عجیب و غریب مبتلا شود .و ارتباط فرد با واقعیت قطع می شود .

## اشکال دارویی

قرص 25 میلی گرمی

قرص 100 میلی گرمی



در صورتی که در میانه درمان به بیماری پروستات آب سیاه در چشم مبتلا شدید، مصرف دارو را قطع کرده و سریعاً با پزشک خود مشورت کنید .

## نکات مراقبتی

در ۶ ماهه اول مصرف هفته ای یکبار خون خود را (از نظر کاهش گلبول های سفید خون ) آزمایش کنید .) و جواب آزمایش را به پزشک خود اطلاع دهید .  
در صورتی که طی این مدت تعداد گلبول های سفید خون طبیعی بود در ۶ ماهه دوم هر دو هفته یکبار خون خود را آزمایش کنید .

از مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تشنج ، داروهای شبه تریاک، ترفنادین و الکل خودداری کنید .