



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ۲۲ بهمن

مسمومیت کشنده با داروی ترک اعتیاد متادون در کودکان و بزرگسالان



تهیه کننده: مریم جعفری (کارشناس پرستاری)

تحت نظارت سوپروایزر آموزشی

مراجعه کنندگان به مرکز MMT

۱۳۹۴

قزوین، انتهای خیابان راه آهن، کوچه پاستور

مرکز آموزشی درمانی ۲۲ بهمن

تلفن: ۰۲۸-۳۳۵۵۵۹۷۸ و ۳۳۵۵۵۰۵۴

داخلی ۲۵۵

کد پستی: ۳۴۱۶۸۹۹۱۹۸

پورتال بیمارستان:

<http://hos22bahman.qums.ac.ir>



علیرغم تحویل شربت متادون در ظروف دارویی، مشاهده شده است که برخی معتادین در حال ترک اعتیاد، به دلیل ترس از آگاهی افراد خانواده از اعتیاد ایشان، متادون را به ظرف غیردارویی منتقل می نمایند. لذا تاکید می شود که بیماران مصرف کننده متادون و نیز خانواده افراد معتاد، از نگهداری دارو در ظروف غیر دارویی همچون شیشه نوشابه، شیشه آلبیمو و... خودداری نمایند و به منظور جلوگیری از مصرف اشتباهی این دارو، از قراردادن آن در مجاورت سایر نوشیدنی ها جداً اجتناب نمایند.



مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) تاکنون **دوازده** مورد مرگ ناشی از مسمومیت اتفاقی با شربت متادون دریافت نموده است که ده مورد از آنان کودکان ۲ الی ۷ ساله ای بوده اند که بدلیل بی احتیاطی فرد معتاد مصرف کننده متادون، والدین و یا سرپرستان خانواده، دچار عارضه گشته اند. پسر بچه های سه، چهار، پنج و شش ساله و دختران دو، سه، چهار، پنج و هفت ساله قربانیانی بوده اند که به اشتباه، بطری نوشابه و یا لیوان حاوی شربت متادون را نوشیده اند، این کودکان نه تنها فرزندان بیمار مصرف کننده متادون، بلکه گاهی از بستگان، میهمانان و برخی موارد از همسایگان فرد معتاد بوده اند و این نشان از گستردگی فاجعه به خارج از حیطه خانواده فرد معتاد دارد.

در این میان یکی از موارد شیرخوار ۲ ماهه ای بوده است که مادر وی، شربت متادون یکی از بستگان خود را در ظرف شربت استامینوفن در یخچال نگهداری می شده است، به اشتباه و به جای شربت استامینوفن به شیرخوار خورانده است که متأسفانه کودک بعد از چند دچار آپنه، سیانوز و ارست قلبی تنفسی شده، فوت می نماید.

این دارو در محلی دور از دسترس کودکان قرار گیرد و والدین دقت نمایند که در صورت مصرف هرگونه دارو برای کودک خود (مانند استامینوفن، شربت سرماخوردگی و.....) پیش از مصرف از درست بودن محتویات ظروف دارویی اطمینان حاصل نمایند و در صورت تردید به آغشته بودن آن با داروی ترک اعتیاد متادون جداً از مصرف آن برای کودک خودداری نمایند

متادون دارویی است که با تجویز پزشک در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار می گیرد با وجود موفقیت اثبات شده این شیوه درمانی در بسیاری از کشورهای جهان، در صورت مصرف سهل انگارانه و غیر مسئولانه این دارو ممکن است خطراتی جدی ایجاد شود. متادون داروی بالقوه **سمی** است که مقدار مورد نیاز آن برای درمان به مقدار سمی این فرآورده بسیار نزدیک است لذا در تجویز، ارائه، نگهداری و مصرف آن می بایست دقت و احتیاط فراوان انجام شود

